

MANUAL NHYTLO™



NHYTLO™
FOOD DIVISION

MANUAL NHYTLO

FÓRMULAS REGISTRADAS DE RACIÓN ESTÁNDAR

NHYTLOTM
FOOD DIVISION

EXPOSICIÓN

REPRODUCTORES

EXPOSICIÓN

Alimento destinado para la suplementación de animales de alto valor productivo (reproductores, animales de exposición, etc). Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan un excelente desempeño y desarrollo de los animales.

Esta formulación incluye una premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micros) recomendadas para esta categoría; así como buffers (bicarbonato de sodio) y aditivos (Monensina, Levadura viva, Cromo, Biotina y Zinc) que tienen como objetivo mejorar la funcionalidad ruminal, la eficiencia de conversión del alimento y asegurar una excelente calidad del pelo y pezuñas.

Categoría: Reproductores, animales de cabaña y/o de exposición

Modo de uso: suplemento de suministro diario. Se recomienda un nivel de suplementación entre 1 - 2,5 % del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

Número de registro: 19487

DESTETE

HIPER PRECOZ

DESTETE HIPER PRECOZ

Alimento destinado para la suplementación de animales con al menos 45 días de edad y con un peso mínimo de 60 kg. Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico, esencial para esta categoría.

Este alimento se destaca por una rápida aceptación por parte del animal y promueve un excelente desarrollo desde las primeras semanas de vida.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría; también se incluye Monensina para la prevención y/o control de la coccidiosis bovina.

Categoría: terneros 45 días y/o 60 kg.

Modo de uso: suplemento de suministro diario. Se recomienda un nivel de suplementación entre 1 - 1,5% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

En destetes solamente a corral se recomienda hacer un aumento gradual del consumo de ración hasta llegar lo más rápido posible al 1% del P. Vivo para consumir la dosis necesaria de Monensina para la prevención y/o control de la coccidiosis.

Por más información ver: **Protocolo NHYTLO** - Destetes y Acostumbramientos al consumo de ración a corral

Número de Registro: 19491

DESTETE

PRECOZ

DESTETE PRECOZ

Alimento destinado para la suplementación de animales con al menos 60 días de edad y con un peso mínimo de 70 kg. Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico, esencial para esta categoría.

Este alimento se destaca por una rápida aceptación por parte del animal y promueve un excelente desarrollo desde las primeras semanas de vida.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría; también se incluye Monensina para la prevención y/o control de la coccidiosis bovina.

Categoría: terneros de 60 días y 70 kg de Peso Vivo.

Modo de uso: suplemento de suministro diario. Se recomienda un uso de 1 - 1,5% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

En destetes solamente a corral se recomienda hacer un aumento gradual del consumo de ración hasta llegar lo más rápido posible al 1% del Peso Vivo para consumir la dosis necesaria de Monensina para la prevención y/o control de la coccidiosis.

Por mas información ver: **Protocolo NHYTLO** - Destetes y Acostumbramientos al consumo de ración a corral.

Número de Registro: 19492

TERNERO

ESTÁNDAR

TERNERO ESTÁNDAR

Alimento destinado para la suplementación de animales con al menos 120 días de edad y con un peso mínimo de 110 kg. Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico, esencial para esta categoría. Este alimento se destaca por una rápida aceptación por parte del animal que promueve excelente desempeño desde el inicio de la suplementación.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría; también se incluye Monensina para la prevención y/o control de la coccidiosis bovina.

Categoría: terneros con 120 días y/o 110 kg de Peso Vivo.

Modo de uso: suplemento suministro diario. Se recomienda un nivel de suplementación entre 1 - 1,5% del Peso Vivo (según criterio y finalidad productiva).

En destetes solamente a corral se recomienda hacer un aumento gradual del consumo de ración hasta llegar lo más rápido posible al 1% del Peso Vivo para consumir la dosis necesaria de Monensina para la prevención y/o control de la coccidiosis.

Por mas información ver: **Protocolo NHYTLO** - Destetes y Acostumbramientos al consumo de ración a corral.

Número de Registro: 19486

RECRÍA

ESTÁNDAR

RECRÍA ESTÁNDAR

Alimento destinado para la suplementación de animales con al menos 180 días de edad y con un peso mínimo de 200 kg. Para su formulación se usan alimentos de alto valor nutritivo, que aseguran un adecuado equilibrio de nutrientes para esta categoría.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría; también se incluye Monensina, recomendada para esta categoría.

Este alimento permite mejorar el desempeño de animales pastoreando sobre campo natural y/o pasturas mejoradas.

Categoría: animales de sobreaño, terneros de 200 kg sobre pasturas mejoradas.

Modo de uso: suplemento suministro diario. Se recomienda un nivel de suplementación entre 0,5 - 1,5% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

Número de Registro: 19483

ENGORDE

ESTÁNDAR

ENGORDE ESTÁNDAR

Alimento destinado para la animales en fase de terminación. Para su formulación se usan alimentos de alto valor nutritivo, que garantizan una alta densidad energética.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría; también se incluye Monensina, recomendada para esta categoría.

Alimento recomendado para la terminación de animales sobre campo natural y/o pasturas mejoradas o puede ser utilizado en categorías de recría siempre y cuando el resto de la dieta aporte la proteína necesaria para un buen crecimiento.

Modo de uso: suplemento de uso diario. Se recomienda un nivel de suplementación entre 0,5 - 1,5% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

Número de Registro: 19490

MANUAL NHYTLO

FÓRMULAS REGISTRADAS DE RACIÓN CON FIBRA

NHYTLOTM
FOOD DIVISION

DESTETE

PRECOZ CON FIBRA

DESTETE PRECOZ CON FIBRA

Alimento destinado para el destete precoz a corral o en situaciones de forraje limitantes, de animales con al menos 60 días de edad y con un peso mínimo de 70 kg.

Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico, y un nivel de fibra para una correcta funcionalidad ruminal.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta la dosis de vitaminas y minerales (macros y micros) recomendados para esta categoría. Incluye Monensina, así como un Buffers (Bicarbonato de Sodio) para la prevención de acidosis ruminal.

Categoría: Terneros de 60 días de edad y 70 kg de Peso Vivo.

Modo de uso: suplemento suministrado “ad libitum” (como único alimento) ya sea en bateas o comederos de autoconsumo. Se recomienda un nivel de suplementación entre 2 - 3,4% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

Se recomienda previamente a iniciar este tipo de manejo en autoconsumos realizar un acostumbramiento con una ración Destete Hiper Precoz o Destete Precoz diaria con el objetivo de que en los primeros días tengamos niveles de consumo de Monensina suficientes para prevenir coccidiosis e ir preparando gradualmente al rumen a recibir altos consumos de ración y prevenir acidosis.

Por mas información ver: **Protocolo NHYTLO** - Destetes y Acostumbramientos al consumo de ración a corral.

Número de Registro: 19486

TERNERO

CON FIBRA

TERNEROS CON FIBRA

Alimento destinado para el destete a corral o en situaciones de forraje limitantes, de animales con al menos 120 días de edad y/o con un peso mínimo de 110 kg.

Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico, y un nivel de fibra que aseguran una correcta funcionalidad ruminal.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta la dosis de vitaminas y minerales (macros y micros) recomendados para esta categoría. Incluye Monensina, así como un Buffers (Bicarbonato de Sodio) para la prevención de acidosis ruminal.

Categoría: terneros 120 días de edad y/o 110 kg de Peso Vivo.

Modo de uso: suplemento suministrado “ad libitum” (como único alimento), ya sea en bateas o comederos de autoconsumo. Se recomienda un nivel de suplementación entre 2 - 3,4% del Peso Vivo (según criterio y finalidad productiva).

Se recomienda previamente a iniciar este tipo de manejo en autoconsumos realizar un acostumbramiento con una ración Destete Precoz diario Ternero Estándar con el objetivo de que en los primeros días tengamos niveles de consumo de Monensina suficientes para prevenir coccidiosis e ir preparando gradualmente al rumen a recibir altos consumos de ración y prevenir acidosis.

Por más información ver: **Protocolo NHYTLO** - Destetes y Acostumbramientos al consumo de ración a corral.

Número de Registro: 19484

RECRÍA

CON FIBRA

RECRÍA CON FIBRA

Alimento destinado para la recría a corral o en situaciones de forraje limitantes de animales con al menos 180 días de edad y con un peso mínimo de 200 kg.

Para su formulación se usan alimentos de alto valor nutritivo que aseguran un adecuado equilibrio de nutrientes para esta categoría, y un nivel de fibra que garantiza una correcta funcionalidad ruminal.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta la dosis de vitaminas y minerales (macros y micros) recomendados para esta categoría, incluye Monensina así como un Buffers (Bicarbonato de Sodio) para la prevención de acidosis ruminal.

Modo de uso: suplemento suministrado “ad libitum” (como único alimento) ya sea en bateas o comederos de autoconsumo. Se recomienda un nivel de suplementación entre 2 - 3,4% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

Categorías: animales sobreaño o terneros pesados.

Se recomienda previamente a iniciar este tipo de manejo en autoconsumos realizar un acostumbramiento con una ración Ternero o Recría Estándar con el objetivo de ir preparando gradualmente al rumen a recibir altos consumos de ración y prevenir acidosis.

Número de Registro: 19481

ENGORDE

CON FIBRA

ENGORDE CON FIBRA

Alimento destinado para la terminación de animales a corral. Para su formulación se usan alimentos de alto valor nutritivo, que garantizan una alta densidad energética y un nivel de fibra que asegura una correcta funcionalidad ruminal.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta la dosis de vitaminas y minerales (macros y micros) recomendados para esta categoría. Incluye Monensina, así como un Buffers (Bicarbonato de Sodio) para la prevención de acidosis ruminal.

Modo de uso: suplemento suministrado “ad libitum” (como único alimento) ya sea en bateas o comederos de autoconsumo, se recomienda un nivel de suplementación entre 2 - 3,4% del Peso Vivo (según criterio técnico y finalidad productiva).

Categorías: novillos, vacas o vaquillonas.

Se recomienda previamente a iniciar este tipo de manejo en autoconsumos realizar un acostumbramiento con una ración Engorde Estándar con el objetivo de ir preparando gradualmente al rumen a recibir altos consumos de ración y prevenir acidosis.

Número de Registro: 19488

MANUAL NHYTLO

FÓRMULAS REGISTRADAS DE RACIÓN CON SAL

NHYTLOTM
FOOD DIVISION

TERNERO

CON SAL

TERNERO CON SAL

Alimento destinado para animales de al menos 120 días de edad y con un peso mínimo de 110 kg que estén en situaciones sobre campo natural o pasturas mejoradas. Se recomienda en aquellos sistemas que necesitan limitar el consumo de ración y/o quieren facilitar la operativa de la raciónada.

Para su formulación se usan alimentos de muy alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico y sal (Cloruro de Sodio) como regulador del consumo.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría. También se incluye Monensina, recomendada para esta categoría.

Categoría: terneros de 120 días de edad y/o 110 kg de Peso Vivo.

Modo de uso: sistemas de suplementación en comederos de autoconsumo. Se recomienda un nivel de suplementación entre 1.5 - 2,2% del Peso Vivo (según criterio y finalidad productiva). La sal es un regulador del consumo que actúa eficazmente en situaciones de buena disponibilidad de pasto.

Por más información ver: **Protocolo NHYTLO** - Destetes y Acostumbramientos al consumo de ración a corral.

Número de Registro: 19485

RECRÍA

CON SAL

RECRÍA CON SAL

Alimento destinado para animales de al menos 180 días de edad y con un peso mínimo de 200 kg que estén en situaciones sobre campo natural o pasturas mejoradas. Se recomienda en aquellos sistemas que necesitan limitar el consumo de ración y/o quieren facilitar la operativa de la raciónada.

Para su formulación se usan alimentos de alto valor nutritivo, que garantizan el aporte de proteína de alto valor biológico y sal (cloruro de sodio) como regulador del consumo.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría; también se incluye Monensina recomendadas para esta categoría.

Categoría: animales de sobreaño y/o terneros pesados.

Modo de uso: sistemas de suplementación en comederos de autoconsumo, sobre campo natural y/o pasturas. Se recomienda un nivel de suplementación entre 1.5 - 2,2 % del Peso Vivo (según criterio y finalidad productiva). La sal es un regulador del consumo que actúa eficazmente en situaciones de buena disponibilidad de pasto.

Número de Registro: 19482

ENGORDE

CON SAL

ENGORDE CON SAL

Alimento destinado para suplementación de animales en fase de terminación, en situación sobre campo natural o pasturas mejoradas. Se recomienda en aquellos sistemas que necesitan limitar el consumo de ración y/o quieren facilitar la operativa de la racionada.

Para su formulación se usan alimentos de alto valor nutritivo, que garantizan una alta densidad energética y sal (Cloruro de Sodio) como regulador del consumo.

Esta formulación contiene un premix (premezcla) que aporta las dosis de vitaminas y minerales (macro y micro) recomendadas para esta categoría. También se incluye Monensina, recomendada para esta categoría.

Modo de uso: sistemas de suplementación en comederos de autoconsumo, sobre campo natural y/o pasturas. Se recomienda un nivel de suplementación entre 1.5 - 2,2% del Peso Vivo (según criterio y finalidad productiva). La sal es un regulador del consumo que actúa eficazmente en situaciones de buena disponibilidad de pasto.

Número de Registro: 19489

RACIÓN BALANCEADA DE CALIDAD
NUTRICIÓN DE ALTO IMPACTO

*Resultados
confiables*

LÍNEA DE RACIONES



NHYTLOTM
FOOD DIVISION

NEW HIGHLAND YTLO S.A. :

PLANTA ELABORADORA: TREINTA Y TRES / RUTA 17- Km 329,5
TELS: 4452 6065 / 099 211 263 / **e-MAIL:** contacto@nhytlo.com
www.nhytlo.com